

Logopedie bij ouderen

De logopedist helpt ouderen met logopedische problemen. Hierbij kunt u denken aan communicatieproblemen, slikproblemen, chronische hoest of neurologische stoornissen of een niet aangeboren hersenletsel (NAH). De logopedist kan u zowel bij u thuis als in de praktijk hulp bieden.

Waarbij kan de logopedist u helpen?

- Afasie; taal-, communicatieproblemen.
- Dysfagie; slikproblemen
- Dysartrie; spraakproblemen
- Communicatieproblemen bij dementie
- Parkinson
- Stemstoornissen
- Gehoorproblemen
- Spraakafzien
- Ademhaling
- Chronisch hoest

Signalen:

- Moeite met gedachten onder woorden te brengen
- Haperingen tijdens het spreken
- Gevoel van 'dronkenmanspraak'.
- Anderen vragen vaker om verduidelijking van wat er gezegd is
- Anderen verstaan u slechter of niet
- De stem klinkt schor, hees
- U heeft het gevoel adem te kort te komen
- Verslikken
- Langdurig hoesten



De logopedist biedt ook **begeleiding aan de mantelzorger en familieleden.**

Niet aangeboren hersenletsel

Een niet aangeboren hersenletsel (NAH) kan veel invloed hebben op **uw dagelijks functioneren**. Denk hierbij aan de communicatie en het slikken. Een NAH kan veroorzaakt worden door **een beroerte** (hersenbloeding of herseninfarct), **hersentumor**, **langdurig zuurstoftekort** en **degeneratieve ziekten zoals Parkinson, dementie, Multiple Sclerose (MS).**

Beroerte

Als gevolg van een beroerte kunnen er delen van de hersenfuncties uitvallen. Dit heeft als gevolg dat er een afasie, dysartrie, verbale apraxie of dysfagie kan ontstaan.

Degeneratieve ziekten

Wanneer er sprake is van een degeneratieve ziekte dan zal de logopedist de behandeling richten op het zo lang mogelijk in stand houden van de functies met betrekking tot de communicatie en het slikken.

Eventuele gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (NAH):

Afasie

Moeite met de communicatie. Begrijpen of produceren van gesproken en/of geschreven taal is aangedaan.

Dysartrie

Als gevolg van een aandoening in het zenuwstelsel kunnen er problemen zijn met de spraak. Het uitspreken van klanken wordt bemoeilijkt doordat bewegingen niet goed gemaakt kunnen worden. Dit beïnvloedt de verstaanbaarheid en vloeiendheid van de spraak.

Dysfagie

Er is dan sprake van slikproblemen. Dit kan ten gevolge van o.a. degeneratieve ziekten, beroerte, operatie in het mond-, keelgebied, ouderen worden. Tijdens het eten of drinken is er een verslikking. Dit kan vervelende gevolgen hebben zoals een longontsteking.

Meer informatie? Bezoek onze website via de QR-code of neem contact met ons op via: 0572 351 100 of info@logopediesalland.nl

